



ÖZÜRLÜLER VAKFI

BASIN BÜLTENİ

15.11.2021

COVID-19 VİRÜSÜ VE ÇOCUKLARDAKİ ETKİLERİ

Sars-Cov2 bilinen diğer adıyla covid-19, Corona(taçlı) virüs ailesine mensup olan bir viral etkindir. 2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde başlayan bu hastalık kısa bir zaman diliminde pandemiye dönüşmüş olup tüm dünyayı ve ülkemizi etkilemiş ve etkilemektedir.

Yaklaşık olarak 3 yıllık bir süreç içerisinde virüsün sayısız kez mutasyona uğradığı ve bu mutasyonlardan potent olanlarında her birinin ayrı ayrı dalgaları olduğu bilinmektedir. Özellikle delta ve omega varyantlarının isminden sıkça bahsedilmektedir.

Çocuklarda covid-19 hastalığı yetişkinlere kıyasla göreceli olarak, daha iyi geçtiği, daha az hastaneye yatış olduğu ve daha az ölüm görüldüğü bir gerçek. Covid-19 geçiren çocuklarda uzamış öksürük, uzamış koku kaybı, uzayan baş ağrısı gibi semptomlar olabildiği bilinmektedir. Bu semptomlar için kontrol amaçlı muayeneler önerilmektedir.

Fakat çocuklarda covid-19 bizzat kendisi değil, hastalığı geçirdikten sonra ortaya çıkabilen korkutucu bir durum mevcut; MIS-C (multisisteminflamatuarsendromcovid) kısaltması ile bilinen bir hastalık. MIS-C, Covid-19 enfeksiyonundan 1-2 ay sonra gelişen bir hiperin flamatuar durumdur.

Bu hastalıktan etkilenen çocukların çoğu önceden sağlıklıdır ve ek hastalık öyküsü yoktur. Bazı çalışmalar obez olmanın risk olduğunu belirtmektedir. Ateş MIS-C'de saptanan en önemli bulgudur. Dirençli ve uzun seyreden ateş varlığı birçok hastalıktan farklıdır. Ateş varlığının yanında göğüs ağrısı, kusma, karın ağrısı ve/veya ishal, gözlerde kızarıklık ve döküntü ile nörolojik semptomları da içerebilen baş ağrısı, bilinç bozukluğu, kollarda veya bacaklarda olan duyu kusurları gibi bulgular olabilir. Başlıca dikkat edilmesi gereken covid-19 enfeksiyonundan 1-2 ay sonra olan 24 saat boyunca aralıksız 38 derece üzeri ateş durumunda hastaneye başvurulması gerektiğidir.

DR.NADİR TAKAR
Aile Hekimliği